

Tableau 6
Analyse des différentes catégories de réponses en fonction de la variable “sexe”

(*moyennes pondérées pour 9 scénarios, le scénario 4 est exclu de ce traitement)

moyennes* mini. 0 à 9 maxi	catégories de réponses	RT1	RT2	RT 3	RT 4	RT5	RT6	RT7	RT 8	RT 1 à 4 mes. non expr. oral.	RT 5 à 8 mes. expr. oral.	RT (1- 2-5- 6) rép. dog .	RT (3- 4-7- 8) rép. non dog.
Masculin	Cas	1,29	0,55	0,3 9	0,1 4	0,77	3,89	1,70	0,7 6	2,36	6,44	6,5 0	2,30
	Témoins	1,28	0,43	1,0 5	0,4 3	0,60	2,50	2,55	0,1 8	3,18	5,83	4,8 0	4,20
Féminin	Cas	1,88	0,56	0,3 8	0,1 3	0,88	3,31	1,75	0,1 3	2,94	6,06	6,6 3	2,38
	Témoins	1,44	0,38	1,3 1	0,2 5	0,50	2,38	2,50	0,2 5	3,38	5,63	4,6 9	4,31

France cas n = 31 ; témoins n = 31 ; Québec cas n = 51 ; témoins n = 25;